

Введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами

- бажано проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19; у разі необхідності (якщо вакцинація проти COVID-19 є перепорою для планової вакцинації за віком чи за схемою) цей термін може бути скорочений до 14 днів;
- вакцинація проти COVID-19 може бути проведена через 14 днів після отримання вакцинації проти інших інфекційних хвороб;
- вищезазначені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 та проти інших хвороб не стосуються вакцинації за екстреними показаннями;
- у разі недотримання зазначених рекомендацій, якщо вакцини вводяться з меншим інтервалом часу щодо введення вакцини проти COVID-19, дози вакцин зараховуються;

важати ці рекомендації як тимчасові й такі, що можуть бути змінені у разі надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ (НТГЕІ)